

ÉTAPES CLÉS DE LA RÉANIMATION DU VEAU

HYGIÈNE DU VÊLAGE

PARC DE VÊLAGE

- Parc propre & sec.

ASSISTANCE AU VÊLAGE

- Vêtements propres, mains nettoyées & désinfectées.
- Nettoyage du matériel (cordes & vèleuse) entre chaque vêlage. Le désinfecter de temps à autre.
- Nettoyage au savon & désinfection de la vulve.

RÉANIMATION DU VEAU technique de réanimation

IL PREND SA RESPIRATION DE MANIÈRE SPONTANÉE & LA MAINTIENIT SANS DIFFICULTÉ : mettre le veau en position du "sphinx" et le laisser tranquille.

IL PREND SA RESPIRATION DE MANIÈRE SPONTANÉE, PEINE À LA MAINTENIR OU PRÉSENTE UNE GÊNE RESPIRATOIRE :

- Pendre le veau (maxi 30 s).
- Mettre le veau en position du « sphinx ».
- Verser de l'eau froide sur la tête.
- Insérer un brin de paille (propre) dans le nez pour le faire éternuer ou utiliser le Calf Resuscitator® en aspiration.



RÉANIMATION MÉDICALE : (*Inosine*, *Doxapram*) lorsque le veau peine à avoir une respiration régulière après les manipulations précédentes.

NURSING DU VEAU : le mettre au chaud dès que la vache s'en est occupé, l'aider à la prise de colostrum dès qu'il peut l'avalier. Vincamine/Papavérine à renouveler 12 h après.

IL NE PREND PAS SA RESPIRATION DE MANIÈRE SPONTANÉE, MAIS SON COEUR BAT :

- Pendre le veau (maxi 60 s).
- Mettre le veau en position du « sphinx »
- Verser de l'eau froide sur la tête.
- Positionner un brin de paille (propre) dans le nez pour vérifier la présence du réflexe pituitaire (éternue) & vérifier le réflexe cornéen (ferme les paupières quand on touche l'oeil). En cas d'absence des 2 réflexes : le pronostic est sombre.
- Utiliser Calf Resuscitator® en aspiration, puis insufflation : idéalement, faire une compression sur le côté gauche de l'encolure pour éviter de souffler l'air dans l'estomac (à faire à 2 personnes). Le Calf Resuscitator® est adaptable à une sonde endotrachéale.



RÉANIMATION MÉDICALE : (*Doxapram*) lorsque le veau a déjà ventilé au moins 1 fois ou en intervention de « la dernière chance » (éternuement, inspiration...) *

NURSING DU VEAU : le mettre au chaud dès que la vache s'en est occupé, l'aider à la prise de colostrum dès qu'il peut l'avalier, ne pas se précipiter pour la prise de colostrum. Vincamine/Papavérine à renouveler 6 h après.



* Réanimation médicamenteuse cardiorespiratoire - médicaments autorisés en médecine bovine :

- L'Inosine
- L'Heptaminol (seul ou en association & la Vincamine /Papavérine).
- La Diprophylline
- L'Adrénaline

GESTION DU CORDON

DÉSINFECTION DU CORDON

- Oui Non
Iode / Povidone / Autre



TRAITEMENT NOMBRIL

- Oui Non
Antibiotiques voie générale



APPORT DU COLOSTRUM

QUANTITÉ

- Recommandée : 1 à 2 L minimum (en fonction de la qualité, de l'absorption, de la précocité d'administration...).
- Préconisée : 2 à 4 L à la 1^{ère} buvée & 10 % du poids du veau dans les premières 24 h de vie. En cas de problème dans l'élevage, si le veau ne tète pas 1/4 h au minimum, traire la vache & donner au veau le complément trait. Biberonner ou sonder à l'aide d'un drencheur.

PRÉCOCITÉ

- 1^{ère} tétée ou 1^{ère} prise dans les 2 h. 2^{nde} tétée dans les 6 h.

QUALITÉ

- Estimée avec pèse-colostrum, colostoballs, réfractomètre (seule méthode fiable chez les bovins allaitants).
- Altérée *via* facteurs suivants : œdème mammaire, pertes de lait, veaux « voleurs », vêlage assisté, jumeaux, parité (nullipares & primipares).

EN CAS DE DOUTE SUR LA QUALITÉ OU LA QUANTITÉ

- Faire boire en complément un colostrum de remplacement (banque colostrale congelée de moins de 8-10 mois ou colostro-remplaceur du commerce de qualité ou colostrum d'un autre élevage). Mais donner autant que possible du colostrum de la mère.

S'IL NE TÈTE PAS :

- Vincamine/Papavérine pendant 2 jours matin & soir.

APPORT D'OLIGO-ÉLÉMENTS & VITAMINES

- Apport d'oligo-éléments & de vitamines par voie orale ou par voie injectable.

MKNEXUS®



Demandez à votre vétérinaire
le poster "LES 3 ÉTAPES DU VÊLAGÉ"



COMPRENDRE LES ÉTAPES CLÉS DE LA RÉANIMATION
DU VEAU EFFECTUÉES PAR VOTRE VÉTÉRINAIRE
GUIDE DU « DÉMARRAGE » DU VEAU